

D Gebrauchsinformation

Argulol • Wasseraufbereiter für Teichfische gegen parasitische Krebstiere: Karpfenläuse (*Argulus*), Ankerwürmer (*Lernaea*), Kiemenkrebse (*Ergasilus*) und parasitische Asseln.
Gebrauchsinformation: Vor Gebrauch schütteln! 5 ml Argulol je 1.000 Liter Teichwasser zugeben. Einen Eimer oder Gießkanne mit Wasser füllen, die abgemessene Menge Argulol mit einem Stab einrühren und die Mischung gleichmäßig im Teich verteilen. Um die später aus den Eiern geschlüpften Krebslarven ebenfalls zu erfassen, kann die Behandlung nach 3 Wochen wiederholt werden. UV-Lampen während der Behandlung für 3 Tage abstellen. Biologische Filter kön-

nen angeschlossen bleiben.
Zusammensetzung je 100 ml: Emamectinbenzoat 1 g, Denatoniumbenzoat 1,5 mg.
Unter Verschluss und für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Raumtemperatur (15 – 25 °C) und vor Licht geschützt aufbewahren. Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen. Argulol wird von Flusskrebsen, Garnelen und Insekten nicht vertragen. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden! Nicht mit Arzneimitteln anwenden.

US Information for use

Argulol • Water treatment for pond fish against parasitic crustaceans: Fish lice (*Argulus*), anchorworms (*Lernaea*), parasitic copepods (*Ergasilus*) and parasitic isopods.
Directions for use: Shake well before using! Add 5 ml Argulol per each 1,000 liters (264 US gal.) of pond water. Fill a bucket or a watering can with water, dissolve the measured amount of Argulol while stirring with a staff, and distribute the mixture evenly in the pond. You may repeat the treatment after 3 weeks as to combat crustacean larvae that have hatched from the eggs in the meantime. Switch off UV lamps for

3 days during the treatment. Biological filters may remain connected.
Composition per 100 ml: emamectin benzoate 1 g, denatonium benzoate 1.5 mg.
Keep under lock and key and out of reach of children and pets. Avoid contact with skin and eyes. Store at room temperature (15 – 25°C / 59 – 77°F) and away from light. Not to be used in conjunction with animals used for human consumption. Argulol is not tolerated by crayfishes, shrimps and insects. Do not use past the expiration of the "best before" date! Do not combine with medications.

F Information mode d'emploi

Argulol • Traitement de l'eau pour poissons de bassin, contre les crustacés parasites : poux des carpes (*Argulus*), vers ancrés (*Lernaea*), poux des branchies (*Ergasilus*) et les isopodes parasites.
Mode d'emploi : Agitez avant emploi ! Verser 5 ml d'Argulol pour 1.000 litres d'eau de bassin. Remplir d'eau un seau ou un arrosoir, ajouter la dose d'Argulol en remuant avec un bâton et répartir le mélange de manière homogène dans le bassin. Pour éliminer ensuite également les larves qui ont éclos, renouveler le traitement au bout de 3 semaines. Pendant le traitement, couper les lampes UV pendant 3 jours. Les filtres biologiques peuvent rester branchés.
Composition dans 100 ml : benzoate d'emamectine 1 g, benzoate de

denatonium 1,5 mg.
Conserver bien fermé et tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver à température ambiante (15 – 25°C) et à l'abri de la lumière. Ne pas utiliser sur des animaux destinés à la consommation. Argulol n'est pas toléré par les écrevisses, les crevettes et les insectes. Ne plus utiliser après la date limite d'utilisation ! Ne pas combiner avec des produits de traitement de l'eau. Distributeur : SERA France SAS, 14 Rue Denis Papin, F 68000 Colmar Tél. 03 89 20 80 60 • Fabriqué en Allemagne

NL Gebruikersinformatie

Argulol • Verzorgingsmiddel voor vijvervissen tegen parasitische kreeftachtigen: karpperluis (*Argulus*), ankerwormen (*Lernaea*), kieuwkreeftjes (*Ergasilus*) en parasitische zeugjes.
Gebruiksaanwijzing: Voor gebruik schudden! 5 ml Argulol per 1.000 liter vijverwater toe dienen. Een emmer of gieter met water vullen, de afgemeten hoeveelheid Argulol met een stokje met het water vermengen en het mengsel gelijkmatig over de vijver verdelen. Om de later uit de eieren komende kreeftjes eveneens te pakken te krijgen, kan de behandeling na 3 weken worden herhaald. UV-lampen tijdens de behandeling gedurende 3 dagen uitzetten. Biologische filters

kunnen aangesloten blijven.
Samenstelling in 100 ml: emamectine benzoate 1 g, denatonium benzoate 1,5 mg.
Afgesloten en ontoegankelijk voor kinderen en huisdieren bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bewaren bij kamertemperatuur (15 – 25 °C) en beschermd tegen licht. Niet gebruiken bij dieren, die voor consumptie bestemd zijn. Rivierkreeften, garnalen en insecten kunnen Argulol niet verdragen. Na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum niet meer gebruiken! Niet in combinatie met verzorgingsmiddelen gebruiken.

I Informazioni per l'uso

Argulol • Trattamento dell'acqua contro crostacei parassiti per pesci nel laghetto: Argulus, Lernaea, Ergasilus e aselle parassite.
Istruzioni per l'uso: agitare prima dell'uso! Aggiungere 5 ml di Argulol per ogni 1.000 litri di acqua nel laghetto. Mettere la quantità necessaria di Argulol in un secchio o in un annaffiatoio pieno d'acqua, mescolare bene e poi distribuire la miscela uniformemente sulla superficie del laghetto. Per poter eliminare anche quei parassiti che si schiudono dalle uova in un secondo momento, si deve ripetere il trattamento dopo 3 settimane. Spegnerne le lampade UV per 3 giorni durante il trattamento. I filtri biologici possono rimanere in funzione.
Composizione per 100 ml: emamectine benzoate 1 g, denatonium

benzoate 1,5 mg.
Conservare in un armadietto chiuso e lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Conservare a temperatura ambiente (15 – 25 °C) e al buio. Da non somministrarsi ad animali destinati all'alimentazione umana. L'Argulol non è tollerato da gamberi, granchi e insetti acquatici. Dopo la scadenza non deve essere più utilizzato! Non può essere usato in combinazione a prodotti curativi. Importato da: SERA Italia s.r.l., Via Gamberini 110 40018 San Pietro in Casale (BO)

E Información para el usuario

Argulol • Tratamiento para peces de estanque contra crustáceos parásitos: piojos de los peces (*Argulus*), gusanos ancla (*Lernaea*), crustáceos de las branquias (*Ergasilus*) y cochinillas parásitarias.
Instrucciones de uso: ¡Agítese antes de usar! Aplique 5 ml de Argulol por cada 1.000 litros de agua de estanque. Llene un cubo o una regadera con agua, mida y añada la cantidad necesaria de Argulol, remueva con una vara y reparta la mezcla de forma homogénea en el estanque. Para poder eliminar las larvas de crustáceo que salgan más adelante de los huevos, puede repetir el tratamiento al cabo de 3 semanas. Durante el tratamiento apague las lámparas UV durante

3 días. Puede dejar los filtros biológicos conectados.
Composición en 100 ml: benzoato de emamectina 1 g, benzoato de denatonio 1,5 mg.
Mantener cerrado y fuera del alcance de los niños y animales de compañía. Evítense el contacto con los ojos y la piel. Conservar a temperatura ambiente (15 – 25 °C) y protegido de la luz. No usar en animales destinados a la alimentación. Los cangrejos de río, las gambas y los insectos no toleran el Argulol. ¡Después de caducada la fecha, no usar!
No combine este producto con medicamentos.

P Instruções para utilização

Argulol • Tratamento para peixes de lago contra crustáceos parasíticos: Piochos das carpas (*Argulus*), vermes âncora (*Lernaea*), crustáceos das guelras (*Ergasilus*) e isópodes parasíticos.
Instruções para utilização: Agite bem antes de usar! Adicione 5 ml de Argulol por cada 1.000 litros de água do lago. Encha um balde ou um regador com água, misture a quantidade medida de Argulol com um pau e distribua a mistura uniformemente no lago. Para atingir também as larvas dos crustáceos que eclodem mais tarde, o tratamento pode ser repetido depois de 3 semanas. Desligue as lâmpadas UV durante o tratamento por 3 dias. Os filtros biológicos podem per-

manecer ligados.
Composição para 100 ml: benzoato de emamectina 1 g, benzoato de denatonio 1,5 mg.
Mantenha fechado à chave e fora do alcance das crianças e animais de estimação. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Guardar à temperatura ambiente (15 – 25 °C) e longe da luz. Não deve ser usado em animais destinados a consumo humano. Argulol não é tolerado por lagostins, camarões e insectos. Por favor não usar após a data "Consumir de preferência antes de"! Não combinar com medicamentos.

S Produktinformation

Argulol • Preparat för dammfiskar mot parasitära kräftdjur: karpplöss (*Argulus*), hakmaskar (*Lernaea*), gälparasiter (*Ergasilus*) och parasitära isopoder.
Bruksanvisning: Omskakas före användning! Tillsätt 5 ml Argulol per 1.000 liter dammvatten. Fyll en hink eller vattenkanna med vatten, tillsätt uppmätt mängd Argulol, rör om och fördela blandningen jämt i dammen. För att bli av med larverna som kläcks senare upprepar du behandlingen efter 3 veckor. Stäng av UV-lampor i 3 dagar under

behandlingen. Biologiska filter får vara i drift.
Sammansättning per 100 ml: emamectinbenzoat 1 g, denatoniumbenzoat 1,5 mg.
Förvaras oätkomligt för barn och husdjur. Undvik kontakt med huden eller ögonen. Förvaras vid rumstemperatur (15 – 25 °C) och skyddat för ljus. Insjökräftor, räkor och insekter tål inte Argulol. Efter bäst-före datumet bör preparatet ej längre användas! Får ej användas samtidigt med preparat mot sjukdomar.

FI Käyttöohje

Argulol • Vedenhoitoaine lammikkokaloille loisäyriäisiä vastaan: Kalatäi (*Argulus*), ankkurimato (*Lernaea*), kidusäyriäiset (*Ergasilus*) ja loissiirat.
Käyttöohjeet: Ravista hyvin ennen käyttöä! Lisää 5 ml Argulolia jokaisesta 1.000 litraa lammikkovettä kohden. Täytä ämpäri tai kastelukannu vedellä, luota annostelut määrää Argulolia veteen ja hämmennä samanaikaisesti tikulla, annostele seos tasaisesti lammikkoon. Uusi käsittely 3 viikon kuluttua jotta tänä aikana kuoriutuneet loisäyriäisten toukat tuhoutuisi. Sammuta UV putket kolmeksi päiväksi hoidon aikana. Biologiset suodattimet saavat olla käynnissä.

Koostumus per 100 ml: emamectin benzoate 1 g, denatonium benzoate 1,5 mg.
Säilytettävä lukitussa paikassa lasten ja lemmikkien ulottumattomissa. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Säilytettävä huoneenlämmössä (15 – 25°C) ja valolta suojattuna. Ei saa käyttää elintarvikkeiksi tarkoitetuille eläimille. Jokitavut, katkat ja hyönteiset eivät siedä Argulolia. Älä käytä tuotetta "parasta ennen" päiväyksen jälkeen. Älä käytä yhdessä hoitoaineen kanssa.

DK Brugsinformation

Argulol • Plejemiddel til behandling af parasit-krebsdyr som f.eks. Fiskelus (*Argulus*), Ankerorm (*Lernaea*), Gællekrebs (*Ergasilus*) og parasit-bænkebidder hos hoveddamsfisk.
Bruksanvisning: Rystes før brug! Tilsæt 5 ml Argulol for hver 1.000 liter hoveddamsvand. Fyld en vandkande med vand, den afmålte mængde Argulol tilsættes under omrøring og fordeles derpå ligeligt i hoveddammen. Behandlingen kan gentages efter 3 uger med henblik på bekæmpelse af eventuelle larvæg, udklækket i mellemtiden. UV-lamper slukkes i 3 dage under behandlingen. Biologiske filtre kan

fungere under behandlingen.
Sammensætning i 100 ml: emamectin benzoate 1 g, denatonium benzoate 1,5 mg.
Opbevares utilgængeligt for børn og husdyr. Undgå kontakt med huden og øjnene. Opbevares mørkt og ved stuetemperatur (15 – 25°C). Må ikke anvendes til dyr, der bruges i fødevarer. Crayfisk, rejser og insekter kan ikke tåle Argulol. Efter udløb af holdbarhedsdatoen må det ikke anvendes mere! Må ikke anvendes sammen med medikamenter.

GR Γενικές Πληροφορίες

Argulol • Θεραπευτική αγωγή για ψάρια λίμνης κατά παρασιτικών καρκινοειδών: Ψάρια ψαριών (*Argulus*), παρασιτικά κοπέποδα (*Ergasilus*) και παρασιτικά ισόποδα.

Οδηγίες χρήσης: Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση! Προσθέστε 5ml Argulol για κάθε 1.000 λίτρα νερού λίμνης. Γεμίστε ένα κουβά ή ένα ποτήρι με νερό, διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα **Argulol** ανακατεύοντας με κρύι, και μοιράστε ομοιόμορφα το διάλυμα στην λίμνη. Μπορείτε να επαναλάβετε την θεραπεία μετά από 3 βδομάδες για να καταπολεμήσετε τον γόνυ των καρκινοειδών που πιθανότατα θα έχει εκκολαφθεί από τα αυγά στο μεσοδιάστημα. Σβήστε τις λάμπες UV για 3 μέρες κατά την διάρκεια της

SI Navodilo za uporabo

Argulol • Pripravek za ribe v ribniku, deluje proti zajedavskim rakom: ribje uši (*Argulus*), zajedavski rakci (*Lernaea*), rakci na škrgah (*Ergasilus*) in mokrice.

Uporaba: Pred uporabo pretresti! Dodajte 5 ml sredstva Argulol na 1.000 litrov vode v ribniku. Napolnite vedro ali škropilnico z vodo, dodajte v njo odmerjeno količino sredstva Argulol, ga s palico primešajte vodi in ga enakomerno porazdelite v vrtnem ribniku. Da bi uničili tudi ličinke rakcev, ki se kasneje izležejo iz jajčec, lahko postopek po treh (3) tednih ponovite. Med postopkom za tri dni izklopite UV-žarnice. Biološki filtri lahko ostanejo priključeni.

H Felhasználási információ

Argulol • Gyógyszer tavi halak számára, parazita jellegű rákfélék ellen: haltetői (*Argulus*), csímbe (*Lernaea*), Ergasilus-hal (*Ergasilus*) és parazita jellegű ászkarákok.

Használati információ: Használat előtt felrázandó! Adjon 5 ml Argulol terméket 1.000 liter tóvízhez. Töltsön meg egy vödört, vagy öntözőkannát vízzel, keverje bele a kimért mennyiségű Argulol-t egy bot segítségével, és a keveréket ossza el egyenletesen a tóban. Hogy a petékéből később kikelő ráklárvákat is elpusztítsuk, a kezelés három hét múlva megismételhetjük. Az UV-lámpákat a kezelés időtartama alatt 3 napig kapcsolja ki. A biológiai szűrőket nem szükséges eltávolítani.

PL Informacje o zastosowaniu

Argulol • Kuracja wodna dla ryb stawowych, przeciwko skorupiakom pasożytniczym takim, jak: splewka (*Argulus*), *Lernaea*, pasożytnicze widłonogi (*Ergasilus*) lub równonogi.

Instrukcja stosowania: Wstrząsając przed użyciem! Dodaj 5 ml Argulolu na każde 1.000 litrów wody w oczku. Napełnij wiadro lub konewkę wodą, rozpuść odpowiednią ilość Argulolu i dobrze wymieszaj, następnie równomiernie rozprzadź mieszaninę w oczku wodnym. Możesz powtórzyć kurację po 3 tygodniach w celu zniszczenia larw skorupiaków, które wykluły się w międzyczasie z jaj. Lampa UV powinna być wyłączona przez 3 dni podczas kuracji. Filtry biologiczne mogą

CZ Informační popis

Argulol • Léčivo pro ryby v zahradním jezírku proti parazitujícím koryšům: kapřičiv (*Argulus*), kotevní červi (*Lernaea*), žábrolísti (*Ergasilus*) a parazitující svinky.

Informační popis: Před použitím zatřepat! 5 ml přípravku Argulol přidat na každých 1.000 litrů vody v jezírku. Kbelík nebo konev naplnit vodou, přidat odměřeně množství přípravku Argulol, dobře promíchat a směs rovnoměrně rozdělit v jezírku. Pro zajištění larev cizopasníků, které se vylíhly z vajíček později, lze dávku po 3 týdnech zopakovat. Během léčby vypnout na 3 dny UV-lampy. Biologické filtry mohou zůstat v provozu.

TR Kullanım bilgileri

Argulol • Havuz balıklarındaki kabuklu parazitlere karşı ilaç: Balık biti (*Argulus*), kancalı kurtlar (*Lernaea*), parazitik kopepodlar (*Ergasilus*) ve parazitik izopodlar.

Kullanma talimatı: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız! Her 1.000 litre havuz suyu için 5 ml Argulol ekleyiniz. Bir kovayı veya su kabını su ile doldurunuz, ölçümlü miktardaki Argulol’ü bir çubukla karıştırarak eritin, karışımı eşit bir şekilde havuza dağıtın. Aynı zamanda yumurtalardan çıkan kabuklu larvalarla mücadele etmek için tedaviyi 3 hafta sonra tekrarlayabilirsiniz. UV lambalarınızı tedavi süresince 3 gün kapatınız. Biyolojik filtreler kullanılabilir.

GUS Инструкция по применению

Аргулол (Argulol) • Кондиционер для воды для прудовых рыб против паразитических ракообразных: карпоедов (*Argulus*), якорных червей (*Lernaea*) и прочих веслоногих рачков (таких, например как *Ergasilus*) и паразитических мокриц.

Указания по применению: Перед применением взболтать! Добавлять 5 мл Аргулол на каждые 1000 л прудовой воды. Необходимое количество **Аргулол** разведите прудовой водой в отдельной емкости (ведре, лейке), как следует перемешайте с помощью палки и равномерно распределите в пруду. Для борьбы с личинками ракообразных, вылупившихся из яиц за период прошедший после первой обработки, вы можете повторить обработку через 3 недели. Отклю-

C 治甲殼類寄生蟲劑

治甲殼類寄生蟲劑 • 用來驅除寄生在池塘魚隻體表的甲殼類寄生蟲的治療劑：魚蝨 (*Argulus*)，箭蟲 (*Lernaea*)，大角魚蝨 (*Ergasilus*) 和等足類寄生蟲。

使用說明：使用前請充分的搖晃均勻！在每 1000 公升的池塘水中加入 5 毫升的治甲殼類寄生蟲劑。把所需劑量的治甲殼類寄生蟲劑倒入一個水桶或是噴壺裏，用一根小棒攪動並把混合物均勻地撒入到池塘中。為了也能去除以後從卵裏孵化出的甲殼類幼體，可在 3 個星期後重複此治療過程。在治療的過程中，要關掉築外線殺菌燈 3 天。生物過濾器可以保持連接的狀態。

J 使用説明書

アルグロル • 池の魚に寄生する、ウオジラミ(チョウ)、イカリムシ、エルガシルス、寄生性等脚類といった、寄生性甲殻類の駆除に

使用方法：ご使用前に容器をよく振ってください！池の水 1000リットルに対しアルグロルを 5ml 入れてください。その際、水の入ったバケツまたはジョウロに規定量のアルグロルを入れ棒でかき混ぜてから、池全体に行き渡るようにまいてください。薬投入後 3 日間は UVライトを消してください。生物フィルターは稼動させたままで構いません。

ROK 사용 설명서

아르구롤 - 반딧불이 몸고기같은데서 거제등생 갑각류 저포 수레발등데, 사슴기레물 (*Argulus*), 촌새 (*Lernaea*), 아가제기레물(*Ergasilus*), 켈레노제기레물.

사용법에대해서: 사용에 전부터주세요! 원포를 1000 리터 용 5 ml 아르구롤 사용. 팔이와 불구레를 팔로 채우고 알맞은 양의 아르구롤을 하데기르 써이곤 뒤 휘젓 것을 골고루 일포에 뿌리란다. 나중에 쟁길 수 있는 알이 저 하데이나는 갑각류같은을 팔기 채워 3일 후 다시 전구할 수 있다. 저피 말려한 3일말한 UV 전구를 떠란다. 쟁글하에 아가가를 쟁글시리 놓이로 쟁란다.

therapeias. Τα βιολογικά φίλτρα παραμένουν στη θέση τους.

Σύνθεση ανά 100ml: emamectin benzoate 1g, denatonium benzoate 1.5mg. Αποθηκεύστε το σε κλειδωμένο ντουλάπι μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια. Φυλάξτε το σκεύασμα σε θερμοκρασία δωματίου (15-25°C) και αποφυέzte την απευθείας έκθεση του σε ηλιακό φως. Μην το χρησιμοποιείτε για ζώα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Το Argulol δεν είναι ανεκτό από τις κοραβίδες, τις γαρίδες και τα έντομα. Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης! Μην συνδυάζετε τη θεραπεία με φαρμακευτικά προϊόντα.

Argulol

Σεστα v 100 ml: emamectin benzoate 1 g, denatonium benzoate 1,5 mg.

Hranite dobro zaprto in izven dosegaa otrok in domačih živali. Preprečiti stik s kožo in očmi. Shranite pri sobni temperaturi (15 – 25°C) in zaščitite pred svetlobo. Ne uporabljati pri živalih, ki so namenjene za prehrano. Sredstva Argulol rečni raki, kozice in žuželke ne prenašajo. Po preteku roka trajanja ne uporabljajte več! Ne uporabljajte hkrati z zdravilnimi sredstvi.

Zastopnik za SI: HP Hobby Program d.o.o., 2311 Hoče

Argulol

Argulol

volítani. Összetétel 100 ml-ben: emamectin benzoate 1 g, denatonium benzoate 1,5 mg.

Lezárvá és gyerekektől és háziállatoktól elzárva tárolni. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Szobahőmérsékleten (15- 25 °C) és fénytől védett helyen tárolni. Ne használja ételmezési célokra tartott állatoknál. Az Argulol a folyami rákok, a garnélák és a rovarok számára elviselhetetlen. A lejárát dátuma után ne használja! Gyógyszerrel együtt ne használja.

Argulol

działać. Skład w 100 ml: emamectin benzoate 1 g, denatonium benzoate 1,5 mg.

Trzymać w zamknięciu pod kluczem z dala od dzieci i zwierząt. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Przechowywać w temperaturze pokojowej (15 – 25 °C) z dala od światła. Nie może być stosowany dla zwierząt przeznaczonych do konsumpcji dla ludzi. Argulol nie jest tolerowany przez raki, krewetki i owady. Nie może być używany po upływie daty ważności! Wyłącznie dla zwierząt! Nie łączyć z lekarami.

Argulol

Složení na 100 ml: emamectin benzoat 1 g, denatonium benzoat 1,5 mg.

Skladovat pod zámkem a chránit před dětmi a domácími zvířaty. Zamezte styku s kůží a očima. Skladovat v temnu při pokojové teplotě (15 – 25°C). Nepoužívejte u zvířat určených ke konzumaci. Argulol není říčními koryši, krevetkami a hmyzem dobře snášen. Nepoužívat po uplynutí lhůty trvanlivosti! Nepoužívat v kombinaci s léčivy.

Distributor: Sera CZ s.r.o., Chlístovice 32, 284 01 Kutná Hora

Argulol

Bileşimi/100 ml: emamectin benzoate 1 g, denatonium benzoate 1,5 mg.

Çocukların ve ev hayvanlarının ulaşamayacağı bir yerde ve kilitli olarak saklayın. Gözlerle ve ciltle temasından kaçının. Oda sıcaklığında (15 – 25 °C) ve karanlıkta muhafaza ediniz. Besin maddesi yapımında kullanılan hayvanlar için kullanılmıaz. Argulol kerevitler, karidesler ve böcekler tarafından tolere edilemez. Son kullanma tarihinden sonra kullanılmıaz! İlaçlarla birlikte kullanmayın.

Argulol

чите уф-лампы на период обработки на 3 дня. Биологические фильтры могут продолжать работать.

Состав в 100 мл: emamectin benzoate 1 г, denatonium benzoate 1,5 мг. Хранить закрытым, в недоступно для детей и домашних животных месте. Избегайте контакта с кожей и глазами. Хранить при комнатной температуре (15 – 25° С), в защищенном от света месте. Не применять для воды в случае ее возможного использования животными, предназначенными для употребления человеком в пищу. Аргулол противопоказан речным ракам, креветкам и насекомым (их водным личинкам). Не использовать после истечения срока годности! Недопустимо применение вместе с лекарственными средствами.

Argulol

應。每 100 毫升所含成分：甲基苯阿維菌素苯甲酸鹽 1 克，苯甲地那敏 1,5 毫克。

請放置在上述的且幼童和寵物觸摸不到的地點！請不要接觸到皮膚和眼睛。請存放在室溫（15-25°C）環境下並且避開光照。請勿將此產品用於人類食用的動物身上。小龍蝦、小蝦和昆蟲不能忍受治甲殼類寄生蟲劑。請勿在使用期限過後繼續使用本產品！請勿和藥物混合使用。

Argulol

後に孵化する甲殻類の幼虫も駆除するため、3 週間後に再び上記の治療を行ってください。

主成分(100ml 中)：エマメクテン安息香酸塩 1g、安息香酸デナトニウム 1.5mg
容器のフタをしっかりと閉め、お子様やペットの手の届かない所に保管してください。薬品が目や皮膚に触れないようご注意ください。直射日光の当たらない室温(15～25℃)で保管してください。家畜には使用しないでください。ザリガニ、エビ、昆虫は本薬に耐性がないのでご使用にならないでください。他の治療薬と併用しないでください。

Argulol

100 ml e dekil gubleşim: emamectin benzoat 1 g, denatonium benzoat 1,5 mg.

Çocukların ve ev hayvanlarının ulaşamayacağı bir yerde ve kilitli olarak saklayın. Gözlerle ve ciltle temasından kaçının. Oda sıcaklığında (15 – 25 °C) ve karanlıkta muhafaza ediniz. Besin maddesi yapımında kullanılan hayvanlar için kullanılmıaz. Argulol kerevitler, karidesler ve böcekler tarafından tolere edilemez. Son kullanma tarihinden sonra kullanılmıaz! İlaçlarla birlikte kullanmayın.

SA تعليمات الإستعمال

أرگولون Argulol مهيم و فءاء من أجل جدول الأسماء ضد الحشرات المسطوية المتطفلة قبل لمسك للمشط (أرگولوس) ولنود الأملاب (ليرنالي) ووسرطان الخياشيم (أرگاسيلوس) والاسبيبات المتطفلة

تعليمات الإستعمال: يجب رجها قبل الإستعمال! أنصف خمس مليلتر من أرگولون لكل 1000 لتر من ماء الجداول، امليه الأبريق القياسي أو النار وخطم الكمية المحددة من الأرگولون بوسنطة قضيب، ووزع الخلطة في الجداول بشكل متناسب. يمكن إعادة العملية بعد ثلاثة أسابيع، لمكافحة يرقات السرطان المتطفلة من الليوسن. ويجب إطفاء الأضواء لقاء المعالجة ثلاثة أيام. يمكن أن يبقى المصنعي البيولوجي مطلقا.

denatonium، emamectin benzoate ١ ج، ١٠٠ مليلتر، **benzoate** ١ ج ملجم.

إنفظها مقلقة بإحكام ولا تتركها في متناول أيدي الأطفال ولهي متطايرة الحويقات المنزلية الألفية. يجب تجنب تلامس هذه المادة بالجلد و العينين، يجب حفظها تحت درجة حرارة المكان (١٥ – ٢٥ درجة مئوية)، ويجب حفظها من الضوء. لإستعمالها لذلك الحويقات لتجني المنع للحصول على المواد الغذائية إن. أرگولون لا يتسجم مع المسطقات المتطفلة والجسديوت و العظرات. لا تتسمله بعد إقضاء تاريخ صلاحيتها! لا تستعملها مع لوية أخرى.